

POSTZEGELS MET AFBEELDINGEN VAN ZEEMOLLUSKEN

1950

Rioekioe-eilanden (Yv. 13)
5 yen — Pteria (Meleagrina) marginifera (L.)

1952

Algerije (Yv. 297)
15 fr — Berbericeras sekikensis (fossiel)

1965

Joegoslavië (Yv. 698)
15 din — Argonauta argo L.

1957

Turks- en Caicoseilanden (Yv. 170)
6 d — Strombus gigas L.

1958

Nieuw Caledonië (Yv. 293)
10 fr — Glaucus (Glaucilla) marginata (Bergh)
Zwitserland (Yv. 608)
20 c — ammoniet (fossiel) (afb. 1)
Cuba (Yv. A184)
30 c — ammoniet (fossiel)

1959—1960

Rioekioe-eilanden (Yv. 61 en 66)
8 c — Phalium bandatum (Perry)

1960

Malediven (Yv. 57)
5 lar. — diverse soorten (niet nader te determineren)
Zwitserland (Yv. 663)
20 c — Gryphaea sp. (fossiel)
Monaco (Yv. 530)
25 c — Sepia officinalis L. en Architeuthis sp.?

1962



Comoren

(Yv. 19 t/m 24 en A 5)
50 c — Cypraecassis rufa L.
1 fr — Harpa conoidalis Lam.
2 fr — Murex ramosus L.
5 fr — Turbo marginatus L.



20 fr — Pterocera scorpio (L.)
25 fr — Charonia tritonis L.
100 fr — Tridacna gigas (L.)

Nederland (Yv. 748)
6 c — ammonietafdruck (fossiel)
Franse Somalikust

(Yv. 311 t/m 314 en A 31/32)



8 fr — Pteria (Meleagrina) marginifera (L.)

10 fr — Tridacna squamosa Lam.
25 fr — Strombus tricornis Humphrey
30 fr — Trochus dentatus (Forskal)
60 fr — Rostellaria magna Schröter
100 fr — Lambis bryonia (Gmelin)
Nieuw Caledonië (Yv. 68)
20 fr — Nautilus macromphalis L.

1962—1963

Wallis en Futuna
(Yv. 162 t/m 167 en A 18)
25 c — Charonia tritonis L.
1 fr — Mitra mitra (L.)
(Syn. M. episcopalis L.)
2 fr — Cypraecassis rufa L.

De illustraties op deze bladzijde zijn ontleend aan het filatelistisch maandblad „Mijn Stokpaardje”, uitgegeven bij „De Postlijn” te Den Haag.



- 4 fr — *Murex tenuispina* Lam.
10 fr — *Oliva erythrostoma*
(Meuschen)
20 fr — *Cypraea tigris* L.
50 fr — *Harpa ventricosa* Lam.



1963

- Nieuwe Hebriden** (Yv. 204 en 208)
30 c — *Nautilus macromphalus* L.
30 c — idem
(Beide zegels hebben dezelfde afbeelding; de ene heeft echter een Franse, de andere een Engelse tekst.)



- Japan** (Yv. 698a)
4 yen — *Petrotrochus (Mikado-trochus) hirasei* (Pilsbry)
Dubai (Yv. 2, 6, 8 en 12)
2 np — *Sepia officinalis* L.
10 np — *Murex nigritus* Philippi
20 np — als 2 np
50 np — als 10 np
Dubai (Yv. T 1 t/m 9)
1 np — *Cardium* sp.
2 np — *Mytilus* sp.



- 3 np — *Ostrea* sp.
(Deze soorten zijn niet nader te determineren.)
4 en 15 np — als 1 np
5 en 25 np — als 2 np
10 en 35 np — als 3 np

1964

- Jamaica** (Yv. 229)
4 d — *Murex antillarum* Hinds



- Monaco** (Yv. 539b)
12 c — *Fasciolaria trapezium* (L.)
Republiek Congo (Yv. 144a)
2 fr — *Lycoteuthis diadema* Chun.



- 1964—1965
Togo (Yv. 400)
20 fr — *Octopus vulgaris* Lam.
Togo (Yv. T 61a t/m 65)
1 fr — *Conus papilionaceus* Hwass
2 fr — *Marginella faba* (L.)
3 fr — *Cypraea stercoraria* L.
4 fr — *Strombus latus* Gmelin
5 fr — *Cardium costatum* L.
10 fr — *Cancellaria cancellata* (L.)



15 fr — *Cymbium pepo* Solander
20 fr — *Typanotomus radula* (L.)

1965

Nieuw-Caledonië (Yv. A 78)
37 fr — *Phyllobranchus (Caliphylla) orientalis* (Kelaart)



Bahama-eilanden (Yv. 206)
10 sh — *Strombus gigas* L.



Salomoneilanden (Yv. 112)
1½ d — *Lambis chiragra* (L.)



Marokko (Yv. 488 t/m 490)
25 fr — *Charonia nodifera* Lam.
25 fr — *Cymbium neptuni* (Gmelin)
25 fr — *Pitaria chione* L.



Barbados (Yv. 246 en 252)

8 c — *Lima* sp.
1 \$ — *Strombus gigas* L.



1966

Malediven (Yv. 172, 174, 176, 179, 181 en 186)

2 1 — *Conus textile* L. (?)
Cymatium lotorium L. (?)
5 1 — *Conus betulinus* L. en
Distorsio anus (L.)
10 1, 30 1 en 1 R — als 2 1
10 R — als 5 1.

(Hoewel opengescheen fraai uitgevoerd zijn deze afbeeldingen niet feilloos. Dit is de oorzaak van de vraagtekens. Ook de paarse kleur van de *Conus betulinus* L. is niet juist, terwijl tenslotte het verkeerd om afdrukken de suggestie wekt, dat de schelpen linksdraaiend zijn.)



San Marino (Yv. 680)
5 1 — *Octopus vulgaris* Lam.
Cuba (Yv. 1002 t/m 1004, 1006)
2 c — *Cypraea zebra* L.
3 c — *Strombus pugilis* L.



7 c — *Aequipecten muscosus* Wood
10 c — *Charonia variegata* Lam.

Japan (Yv. 840)

35 y — *Watasenia scintillans* (Berry)



Noord-Korea (Yv. 647, 649)

5 ch — *Ommatostrephes sloantii pacificus* (Steenstrup)
10 ch — *Octopus dofleini* (Wülker)



Roemenië (Yv. 2241, 2245)

10 b — *Nassarius reticulatus* (L.)
1.35 1 — *Mytilus galloprovincialis* Lam.



1967

Japan (Yv. 829C, 829D)
15 y — *Ommatostrephes sloanii pacificus* (Steenstrup)
15 y — *Turbo cornutus* Solander



Bahama-eilanden (Yv. 254)

2 d — *Strombus gigas* L.



Nederland (Yv. 845 t/m 847)

12 c — eierkapsel van de wulk,
15 c — *Buccinum undatum* L.
20 c — *Mytilus edulis* L.



Seychellen (Yv. 229 t/m 232)

15 c — *Cypraea tigris* L.
Cypraea moneta L.
Cypraea talpa L.
40 c — *Conus textile* L.
Conus betulinus L.
Conus virgo L.
1 R — *Lambis chiragra arthritica* Röding



2.25 R — *Charonia tritonis* (L.)
Terebra subulata (L.)

Cuba (Yv. 1159)

2 c — *Octopus vulgaris* Lam.

1967-1968

Rioekioe-eilanden (Yv. 143, 144, 144A,
144B, 144C)

3 c — *Mitra mitra* (L.)

3 c — *Murex triremis* (Perry)

3 c — *Lambis chiragra* (L.)

3 c — *Turba marmoratus* L.

3 c — *Strombus bulla* (Röding)



1968

Fiji-eilanden (Yv. 221, 231)

2 p — *Nautilus pompilius* L.

3 sh — *Cypraea aurantium* Gmelin



Tsjechoslowakije (Yv. 1657, 1660)

30 h — *Hypophylloceras bizonatum*
(Fritsch)

1 k — *Chlamys gigas* (Schlotheim)



Malediven (Yv. 290, 291, 293, 294)

10 l — *Malea pomum* (L.)

Mitra papalis (L.)

25 l — *Barnea costata* (L.)

Turbo petholatus L.

1 R — als 25 l

2 R — als 10 l

(Evenals de vorige maal zijn de afbeeldingen nauwelijks te determineren. Wederom ook zijn de schelpen zodanig afgebeeld, dat zij de suggestie wekken linksdraaiend te zijn.)

Albanië (Yv. 1118, 1120)

50 q — *Loligo vulgaris* Lam.

25 q — *Buccinum undatum* L.



Uruguay (Yv. A336, 340)

15 p — *Octopus tehuelcus* (d'Orbigny)

50 p — *Loligo brasiliensis* Blainville



Nieuw-Caledonië (Yv. 354, A98-100)

10 f — *Conus geographus* L.

39 f — *Conus lienardi* Bernardi & Cross

40 f — *Conus cabritii* Bernardi

70 f — *Conus coccineus* Gmelin

1968-1969

Papoea en Nieuw-Guinea (Yv. 140-152,
154)

1 c — *Ovula ovum* (L.)

3 c — *Strombus sinuatus* Humphry

4 c — *Conus litoglyphus* Hwass

5 c — *Conus marmoratus* L.

7 c — *Mitra mitra* (L.)

10 c — *Voluta norrisi* Gray

12 c — *Phalium areola* L.

15 c — *Lambis scorpius* (L.)

20 c — *Tridacna squamosa* Lam.

25 c — *Lioconcha castrensis* (L.)

30 c — *Murex ramosus* L.

40 c — *Nautilus pompilius* L.

60 c — *Charonia tritonis* (L.)

2 d — *Conus gloria-maris* Chemnitz



Noord-Korea (Yv. 813 - 815)

- 5 x - *Patinopecten yessoensis* (Jay)
- 5 x - *Mactra spectabilis* Lischke
- 10 x - *Modiolus modiolus* (L.)



1969

Mauritius (Yv. 331, 337 - 340, 342)

- 4 c - *Mitra mitra* (L.)
- 30 c - *Harpa major* Röding
Harpa davidis Röding
(Syn. *H. conoidalis* Lam.)
Harpa costata L.
- 35 c - *Argonauta argo* L.
- 40 c - *Hexabranchus marginatus* (Pease)
- 50 c - *Lambis (Millipes) violacea* (Swainson)
Lambis crocata (Link)
- 75 c - *Conus clytospira*
Melvill & Standen



Cocos (Keeling) eiland (Yv. 8 - 10)

- 1 c - *Turbo lajonkairii* Deshayes
- 2 c - *Tridacna crocea* Lam.
- 3 c - *Tridacna derasa* Röding



Nieuw-Caledonië (Yv. 358 - 360)

- 2 f - *Murex haustellum* L.
- 5 f - *Murex triremis* Perry
- 15 f - *Murex ramosus* L.
- 100 f - *Murex brunneus* Link



Anguilla (Yv. 43 - 46)

- 10 c - *Turbo canaliculatus* Hermann
Astraea caelata Gmelin
Gaza superba Dall
- 15 c - *Spondylus americanus* Hermann
- 40 c - *Phalium granulatum* Born
Phalium cicatricosum Gmelin
Sconsia striata Lam.
- 50 c - *Charonia tritonis nobilis* Conrad



Hongarije (Yv. 2060)

- 2 ft - *Reineckia crassicostata*



1970

Algerije (Yv. 511)

- 40 c - *Pinna nobilis* L.

Noord-Vietnam (Yv. 668 - 671)

- 12 xu - *Turbo marmoratus* L.
- 12 xu - *Melo melo* (Light foot)
- 20 xu - *Cypraea tigris* L.
- 1 d - *Charonia tritonis* L.



Indonesië (Yv. 581 - 584)

- 5 r - *Cymbiola (Aulica) nobilis* (Lightfoot)
- 7.50 r - *Cymatium pileare* (L.)
- 10 r - *Lambis lambis* (L.)
- 15 r - *Murex ternispina* Lam.



Nieuw-Caledonië

(Yv. 368 - 369; A 113 - 114)

- 10 f - *Cypraea cribaria* L.
- 21 f - *Cypraea (Talparia) talpa* L.
- 35 f - *Cypraea (Arestorides) argus* L.
- 60 f - *Cypraea (Leporicypraea) mappa* L.



Angola (Yv. 570)

- 6 a - *Nostoceras aff. helicinum* Steph.

Mozambique (Yv. 554)

- 50 c - *Lytodiscooides conduciensis* (Choffat)



Malagasy (Yv. 471)

- 20 f - Ammoniet (fossiel)

Singapore (Yv. 108)

- 15 c - *Tridacna gigas* L.

Malagasy (Yv. 475 - 477)

- 5 f - *Lyria delessertiana* (Petit de la Saussaye)

- 10 f - *Murex tribulus* L.

- 20 f - *Spondylus versicolor* Schreibers

(De beide gastropoden van deze serie zijn verkeerd om afgedrukt en maken daardoor ten onrechte de indruk linksdraaiend te zijn).



Polynesië (Yv. 37)

- 27 f - *Pteria (Pinctada) margarifera* L.



Filippijen (Yv. 787-790)

- 5 sk — *Tridacna squamosa* Lam.
- 10 sk — *Spondylus regius* L.
- 20 sk — *Murex triremis* Perry
- 40 sk — *Conus gloria-maris* Chemnitz



Nieuw-Caledonië (Yv. 368, 369; A 113, 115)

- 1 f — *Strombus epidromus* L.
- 10 f — *Strombus variabilis* Swainson
- 22 f — *Strombus sinuatus* Humprey
- 34 f — *Strombus vomer* (Röding)



Formosa (Yv. 738-741)

- 1 d — *Tibia fusus* (L.)
- 2.50 d — *Lyria kurodai* (Kawamura)
- 5 d — *Conus stupa* Kuroda
- 8 d — *Entemnotrochus rumphii* (Schepman)

(De Conus is verkeerd om afgedrukt en lijkt daaroor linksdraaiend)



Turks en Caicos eiland(en) (Yv. 273)

- 3 c — *Strombus gigas* L.

Comoren (Yv. 72-76)

- 5 f — *Conus lithoglyphus* Hwass
- 10 f — *Conus litteratus* L.
- 20 f — *Conus aulicus* L.
- 35 f — *Nerita polita* L.
- 60 f — *Cypraea caputserpentis* L.



Kenia (Yv. 34-48)

- 5 c — *Pharaonella perna* (Spengler)
- 10 c — *Mitra mitra* L.
- 15 c — *Clanculus puniceus* Phil.
- 20 c — *Cypraea mauritiana* (L.)
- 30 c — *Haliotis varia* L.
- 40 c — *Trochus flammulatus* Lam.
- 50 c — *Janthina janthina* (L.)
- 60 c — *Cypraeocassis rufa* (L.)
- 70 c — *Nautilus pompilius* L.



- 1 s — *Murex ramosus* L.
 1.50 s — *Charonia tritonis* L.
 2.50 s — *Fasciolaria trapezium* (L.)
 5 s — *Turbo fluctuosus* Wood
 10 s — *Conus textile* L.
 20 s — *Lambis scorpius* (L.)



1971-1972

- Ivoorkust** (Yv. 312, 314, 324, 326-328, 337-339)
- 1 f — *Aporrhais pesgallinae* Barnard
 15 f — *Natica fanel* Récluz
 15 f — *Marginella desjardini* Marche-Marchad
 20 f — *Xenophora senegalensis* P. Fischer
 25 f — *Conus prometheus* Hwass
 40 f — *Conus genuanus* L.
 40 f — *Pecten flabellum* Gmelin
 45 f — *Strombus latus* Gmelin
 65 f — *Cypraea stercoraria* L.

1972



- Nieuw-Caledonië** (Yv. 379-380; A 129-130)
- 1 f — *Lambis scorpius* (L.)
 3 f — *Lambis lambis* (L.)
 25 f — *Lambis crocata* (Link)
 50 f — *Lambis chiragra* (L.)



Afars et des Issas (Yv. 377-380)

- 4 f — *Clanculus pharaonius* L.
 9 f — *Cypraea pantherina* Lightfoot
 20 f — *Cypraeocassis rufa* (L.)
 50 f — *Melo aethiopica* (L.)

Nieuw (Yv. 133)

- 3 c — *Octopus lure*



Nieuwe Hebriden (Yv. 342, 343, 345, 349)

- 25 c — *Cypraea gaskoini* Reeve
 30 c — *Oliva rubrolabiata* H. Fischer
 65 c — *Strombus plicatus* Röding
 5 f — *Turbo marmoratus* L.



Antigua (Yv. 279-282)

- 3 c — *Cypraeocassis testiculus* (L.)
 5 c — *Cypraea zebra* L.
 35 c — *Strombus pugilis* L.
 50 c — *Strombus raninus* Gmelin

Mauretanië (Yv. 303-304)

- 25 f — *Acrospirifer* sp.
 (Deze afbeelding is nogal gestyleerd)

Samoa (Yv. 305, 311)

- 1 s - *Strombus taurus* Reeve
10 s - *Charonia tritonis* (L.)



Fujeira (Yv. 130)

- 5 d - *Strombus gigas* L.
10 d - *Strombus pugilis* L.
15 d - *Murex troscheli* Lischke
20 d - *Lyropecten nodosus* (L.)
25 d - *Charonia Tritonis* (L.)
60 d - *Nerita* sp.
met heremietkreeft *Pagurus* sp.



1973

Afars en Issas Territorium (Yv. 85)

- 40 f - *Octopus macropus* Riss



Malagasië (Yv. 516 en 521)

- 3 f - *Volva volva* L.
10 f - *Lambis chiragra* L.
15 f - *Harpa major* Röding
25 f - als 3 f
40 f - als 15 f
50 f - als 10 f



Jersey (Yv. 83)

- 20 p - *Haliotis tuberculata* L.



Haiti (Yv. 732, 734)

- 5 c - *Micromelo undata* Brugière
25 c - *Cyerce crystallina*



1974

Kenia (Yv. 49, 50)

- 50 c - *Janthina janthina* (L.)
- 70 c - *Nautilus pompilius* L.

(Deze zegels zijn een herdruk van de reeds eerder verschenen zegels — zie bladzijde 11 —, maar in tegenstelling tot de vorige maal thans met op de zegels de juiste namen van de afgebeelde soorten.)



Aitutaki (Yv. 95-106)

- ½ c - *Murex ramosus* L.
- 1 c - *Nautilus macromphalus* Sowerby
- 2 c - *Harpa major* Röding
- 3 c - *Phalium strigatum* Gmelin
- 4 c - *Cypraea talpa* L.
- 5 c - *Mitra stictica* (Link)
- 8 c - *Charonia tritonis* (L.)
- 10 c - *Murex pecten* Lightfoot
- 20 c - *Oliva sericea* (Röding)
- 25 c - *Tutufa rubeta* (Röding)
- 60 c - *Strombus latissimus* L.
- 1 d - *Biplex perca* (Perry)



Nieuw-Caledonië (Yv. 150-152)

- 3 f - *Ovula ovum* (L.)
- 32 f - *Hydatina physis* (L.)
- 37 f - *Tonna perdix* (L.)



Coökeilanden (Yv. 372-385)

- ½ c - *Phalium glaucum* (L.)
- 1 c - *Vasum turbinellus* (L.)
- 1½ c - *Corculum cardissa* L.
- 2 c - *Terebellum terebellum* L.
- 3 c - *Aulica vespertilio* L.
- 4 c - *Strombus gibberulus* L.
- 5 c - *Cymatium pileare* (L.)
- 6 c - *Cypraea exputserpentis* L.
- 8 c - *Bursa granularis* (Röding)
- 10 c - *Murex pecten* Lightfoot
- 15 c - *Mitra mitra* L.
- 20 c - *Natica alapapillionis* Röding
- 25 c - *Gloripallium pallium* L.
- 30 c - *Conus miles* L.
- 50 c - *Conus textile* L.
- 60 c - *Oliva sericea* (Röding)



Togo (Yv. 818-821; A237, 238)

- 10 f - *Tymanonotus fuscatus radula* (L.)
- 20 f - *Tonna galea* L.
- 30 f - *Conus mercator* L.
- 40 f - *Cardium costatum* L.
- 90 f - *Voluta ponsonbyi* (E. A. Smith)
- 100 f - *Casmaria iredalei* Bayer

(De hoogste twee waarden zijn ook als blok verschenen.)

Pitcairneilanden (Yv. 135—138)

- 4 c - *Rhinoclavis* sp.
- Mitra sp.
- 10 c - *Pyrene flava* (Bruguière)
- 18 c - *Cellana* sp.
- Siphonaria sp.
- 50 c - *Ctena* sp.

(Deze zegels zijn ook als blok verschenen)




Caimanen (Yv. 333, 341, 342)

- 1 c - *Murex pomum* Gmelin
met heremietkreeft *Dardanus venosus*
- 15 c - *Murex cabritii* Bernardi
- 20 c - *Strombus gigas* L.



Maagdeneilanden (Yv. 272-275)

- 5 c - *Charonia variegata* Lam.
 - 18 c - *Murex brevifrons* Lam.
 - 25 c - *Nerita peloronta* L.
 - 25 c - *Latirus virginensis* Abbott
- (Deze zegels zijn ook als blok verschenen).




Tokelau-eilanden (Yv. 42-44)

- 3 c - *Cypraea mauritiana* L.
- 5 c - *Cypraea tigris* L.
- 15 c - *Cypraea talpa* L.
- 25 c - *Cypraea argus* L.



Biot (Britse gebieden in de Indische Oceaan) (Yv. 59-62)

- 45 c - *Terebra nebulosa* Sowerby
Terebra subulata L.
- 75 c - *Turbo marmoratus* L.
- 1 r - *Drupa rubusidaeus* Röding
- 1.50 r - *Cypraecassis rufa* (L.)



St. Vincent (Yv. 30-47)

- 1 c - *Spondylus americanus*
Hermann
- 2 c - *Pecten zigzag* L.
- 3 c - *Cypraecassis testiculus* (L.)
- 4 c - *Voluta musica* L.
- 5 c - *Pinna carneae* Gmelin

- 6 c - *Cymatium femorale* L.
 8 c - *Cassis flammea* (L.)
 10 c - *Oliva caribaeensis*
 Dall & Simpson
 12 c - *Architectonica nobilis* Röding
 15 c - *Conus granulatus* L.
 20 c - *Terebra taurina* (Röding)
 25 c - *Chione paphia* L.
 35 c - *Astraea phoebia* Röding
 45 c - *Tellina listeri* Röding
 50 c - *Strombus gallus* L.
 1 d - *Astraea tuber* L.
 2.50 d - *Conus dominicanus* Hwass
 5 d - *Lima scabra* Born



Angola (Yv. 582—601)

- 25 c - *Harpa doris* Röding
 30 c - *Murex melanamathos* (Gmelin)
 50 c - *Venus foliaceo-lamellosa*
 (Chemnitz) Schröter
 70 c - *Lathyrus filosus* Schubert &
 Wagner
 1 e - *Cymbium cisium* Menke
 1.50 e - *Cassis tessellata* (Gmelin)
 2 e - *Cypraea stercoraria* L.
 2.50 e - *Conus prometheus* Hwass
 3 e - *Strombus latus* Gmelin
 3.50 e - *Tymanonotonus fuscatus* L.
 4 e - *Cardium costatum* L.
 5 e - *Natica fulminea* (Gmelin) var.
 cruentata Lam.
 6 e - *Lyropecten nodosus* L.
 7 e - *Tonna galea* L.
 10 e - *Donax rugosus* L.
 25 e - *Cymatium trigonum* Gmelin
 30 e - *Oliva acuminata* Lam.
 35 e - *Semifusus morio* L.
 40 e - *Clavatula lineata* Lam.
 50 e - *Architectonica nobilis* Röding

1975



Malediveneilanden (Yv. 511—520)

- 1 1 - *Cassis nana* Tenison-Woods
 2 1 - *Murex pecten* Lightfoot
 3 1 - *Harpa major* Röding
 4 1 - *Lambis chiragra* (L.)
 5 1 - *Conus pennaceus* Born
 60 1 - *Cypraea diliculum* Reeve
 75 1 - *Clanculus puniceus* Philippi
 2 r - als 3 1
 3 r - als 2 1
 5 r - *Murex ramosus* (L.)



Aitutaki (Yv.

- 2 d - *Terebra maculata* L.
 5 d - *Cypraea hesitata* Iredale



Cookeilanden (Yv. 414-417)

- 4 d – diverse soorten, al eerder afzonderlijk afgebeeld op de waarden $\frac{1}{2}$ c, $1\frac{1}{2}$ c, 2 c, 3 c, 6 c, 10 c, 15 c, 20 c, 25 c, 50 c en 60 c (mariene filatelie 14)
- 6 d, 8 d en 10 d idem



Gilbert en Ellice-eilanden (Yv. 236 – 239)

- 4 c – *Cypraea argus* L.
10 c – *Cypraea cibraria* L.
25 c – *Cypraea talpa* L.
35 c – *Cypraea mappa* L.

(Deze zegels zijn ook verschenen als blok, waarop tevens een stukje kust is afgebeeld.)



Noord-Vietnam (Yv. 832, 834-836)

- 12 xu – *Loligo vulgaris* Lam.
30 xu – *Haliotis tuberculata* L.
40 xu – *Pinctada martensii* (Dunker)
50 xu – *Sepia officinalis* L.

Rusland (Yv. 4162)

- 4 k – *Rapana venosa* Valenciennes



Grenada (Yv. 611-617, BF 43)

- $\frac{1}{2}$ c – *Chama macerophylla* Gmelin
1 c – *Smaragdia viridis* (L.)
2 c – *Trachycardium muricatum* (L.)
25 c – *Janthina janthina* L.
50 c – *Arca zebra* Swainson
75 c – *Strombus pugilis* L.
1 d – *Sthenorystis pernobilis*
Fischer & Bernardi
2 d – *Voluta musica* L.

(De 2 d is alleen in blok verschenen; daarop is tevens de keverslak *Chiton squamosus* L. afgebeeld.)



1975-1976

Afars en Issas (Yv. 394, 400-403, 414, 422-423)

- 5 f – *Conus textile* L.
10 f – *Conus vexillum sumatrensis*
Hwass.



- 15 f - *Cypraea pulchra* Gray
 20 f - *Murex scolopax* Dillwyn
 40 f - *Bursa spinosa* (Lam.)
 45 f - als 20 f
 55 f - *Cypraea erythraeensis* Sowerby
 60 f - *Conus taeniatus* Hwass

1976




Thailand (Yv. 762-765)

- 75 st - *Mytilus viridis* L.
 1 b - *Turbo marmoratus* L.
 2,75 b - *Oliva mustelina* Lam.
 5 b - *Cypraea moneta* L.

SCHELLEN OP POSTZEGELS

Het lijkt misschien allemaal zo eenvoudig, maar af en toe blijkt het toch niet goed mogelijk de op postzegels afgebeelde schelpen te determineren. Dit heeft dan tot gevolg, dat moet worden volstaan met het geven van een meer algemene aanduiding, in het gunstigste geval de geslachtsnaam, zoals is gebeurd bij de Pitcairneilanden



(mariene filatelia 15). In een dergelijk geval geven de namen op de zegels, zo die al aanwezig zijn, geen verdere opheldering, terwijl ook de postdienst van het betrokken land niet in staat is aanvullende informatie te verschaffen. De Pitcairneilanden liggen afgelegen midden in de Grote Oceaan. Een vliegverbinding ontbreekt en de eilanden worden slechts weinig door schepen aangedaan. Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat wij eerst na ruim een half jaar via deze geïsoleerde eilanden terecht kwamen bij degene die de tekeningen heeft gemaakt, miss Jennifer M. Toombs in het hiervandaan helemaal niet zo veraf gelegen Reading in Engeland. De afgebeelde schelpen heeft de artiste zelf op de stranden van de Pitcairneilanden gevonden. Toen de tekeningen klaar waren moesten alleen nog even de namen erbij, maar dat bleek niet zo eenvoudig. Zelfs de hulp van miss Kathy M. Way van de sectie Mollusken van het British Museum (Natural History) gaf slechts gedeeltelijk resultaat. Dankzij de medewerking van de beide dames is de determinatie nog eens uitgevoerd, maar het beschikbare materiaal bood eenvoudig onvoldoende mogelijkheden, zoals de bijgaande afbeelding, vervaardigd door miss Way, toont: deels afgeslepen en deels kapotte exemplaren. Toch is miss Way nog in staat geweest een aanvulling te geven. De op de 4 c afgebeelde Rhinoclavis is alsnog met zekerheid gedetermineerd als *Rhinoclavis sinensis* (Gmelin). Dit wellicht niet geheel bevredigende, maar maximale resultaat, is in ieder geval te danken aan de medewerking van de beide dames, waarvoor alle hulde. Overigens geeft dit u tevens een beeld hoe soms schelpen op postzegels verzeild kunnen raken.

W. F.



Grenada-Grenadines (Yv. 124, - 130, BF 16)

- ½ c - *Nerita peloronta* L.
- 1 c - *Donax denticulatus* L.
- 2 c - *Strombus raninus* Gmelin
- 3 c - *Distorsio clathrata* Lam.
- 25 c - *Phalium granulatum* Born
- 50 c - *Cassis tuberosa* L.
- 75 c - *Strombus gigas* L.
- 2 \$ - *Charonia variegata* Lam.

(2\$ in blok met nog enige schelpen, waaronder *Strombus gigas*).



Salomonseilanden (Yv. 302, 303, 305 - 310)

- 6 c - *Cypraea aurantium* Gmelin
- 10 c - *Conus gloria-maris* Chemnitz
- 15 c - *Nautilus pompilius* L.
- 20 c - *Murex pecten* Lightfoot
- 25 c - *Trochus niloticus* L.
- 35 c - *Cymbiola rutila* (Broderip)
- 45 c - *Lambis crocata* (Link)
- 1 \$ - *Charonia tritonis* L.



St. Vincent (Yv. 81)
10 \$ - *Cypraea zebra* L.



Oostenrijk (Yv. 1338)
3 s - *Virgatospinctes transitorius* Oppel

Tuvalu (Yv. 19)
5 c - *Octopus* sp.



Wallis en Futuna (Yv. 193-196)
20 f - *Conus ammiralis* L.
23 f - *Cypraea assellus* L.
43 f - *Turbo petholatus* L.
61 f - *Mitra papalis* L.



Afars en Issas (Yv. 434, 435)
 5 f - *Murex palmarosae* Lam.
 20 f - *Cypraea exusta* Sowerby



Dominica (Yv. 505 - 511, BF 41)
 ½ c - *Architeconica nobilis* Röding
 1 c - *Cassis flammea* L.
 2 c - *Conus mus* Hwass
 20 c - *Vasum muricatum* Born
 40 c - *Strombus pugilis* L.
 50 c - *Coralliphila abbreviata* Lam.
 2 \$ - *Astraea phoebia* Röding
 3 \$ - *Murex pomum* Gmelin
 (De 2\$ is in blok uitgegeven)



Somalië (Yv. 194 - 199)
 0.50 s - *Cypraea gracilis* Gaskoin
 0.75 s - *Charonia ?rubicunda* Perry
 1 s - *Chlamys townsendi* Sowerby
 2 s - *Cymatium ranzanii* Bianconi
 2.75 s - *Conus argillaceus* Perry
 2.90 s - *Strombus oldi* Emerson



Umm al Qiwain (niet gecat.)
 5 dh - ? (*little leopard*)
 15 dh - *Voluta elliotti* (Sowerby)
 3 R - *Calpurnus verrucosus* L.



1977

Singapore (Yv. 262 - 270, 274, 276)
 1 c - *Discors lyratum* (Sowerby)
 5 c - *Decatopecten plica* (L.)
 10 c - *Conus marmoreus* L.
 15 c - *Lambis scorpius* (L.)
 20 c - *Aplustrum amplustre* (L.)
 25 c - *Babylonia spirata* L.
 35 c - *Spondylus regius* L.
 50 c - *Biplex perca* (Perry)
 75 c - *Murex troscheli* Lischke
 1 \$ - *Astraea* sp.

met heremietkreeft *Pagurus punctulatus*

2 \$ - *Sepia pharaonis*



Afars en Issas (Yv. 424, 427, 443, 444)
 5 f - *Cypraea tigris* L.
 30 f - *Conus betulinus* L.
 70 f - *Conus striatus* L.
 85 f - *Cypraea mauritiana* L.

Allereerst enkele aanvullingen en wijzigingen.



Indertijd is - bladzijde 4 - de Nederlandse 6 ct zomerzegel vermeld zonder de naam van de daarop afgebeeld ammoniet. Die naam is wel later in de toen nog gestencilde Varia opgenomen. Van deze gelegenheid wordt gebruikt gemaakt om die naam alsnog in deze rubriek te vermelden. Deze luidt *Ammonites spinatus* d'Orbigny. De afbeelding op de postzegel geeft een negatieve afdruk van de ammoniet in een stukje steen weer. Dit fossiel is uit het Lias, Midden-Jura. De zegel is tweemaal afgebeeld, waarvan een maal kopstaand. U kunt daardoor in één oogopslag zien, dat er sprake is van een negatieve afdruk, die omgedraaid eruit ziet alsof de ammoniet erop ligt.

In diezelfde serie is op onverklaarbare wijze een fout geslopen. Bij de 10 ct is de naam *Murex pecten* Lightfoot opgegeven, hoewel onmiddelijk is te zien, dat er van een Murex-soort helemaal geen sprake is. De zegel geeft de naam *Terebra muscaria* Lam. aan, maar dit is een synoniem voor *Terebra areolata* (Link).

En dan nu nog enige nieuwe series.

Polynesië (Yv. 114-116)

25 f - *Murex steeriae* Reeve

27 f - *Conus guaguini* Richard & Salvat

35 f - *Conus marchionatus* Hinds



Brazilië (Yv. 1265-1267)

1.30 C - *Strombus goliath* Schröter

1.30 C - *Vasum cassiforme* Kiener

1.30 C - *Murex tenuivaricosus* Dautzenberg



De Oliva-soort, afgebeeld op de 60 c zegel van de Cookeilanden - bladzijde 14 - is op de zegel aangegeven als *Oliva sericea* (Röding), welke naam ook in de tekst is overgenomen. Bij nader inzien moet echter worden aangenomen, dat de zegel niet de juiste soort vermeldt, en dat de afgebeelde soort *Oliva minacea* Röding is.



Anguila (Yv.)

3 c - *Strombus gigas* L.

Guinée (Yv. 581-589)

1 s - *Murex hoplites* P. Fischer

2 s - *Perrona lineata* Lam.

4 s - *Marginella pseudofabia* (Sowerby)



- 5 s - *Tympanotonus fuscatus* L.
 7 s - *Marginella strigata* Dillwyn
 8 s - *Harpa doris* Röding
 10 s - *Demoulia pinguis* A. Adams
 20 s - *Bursa scrobiculator* L.
 25 s - *Marginella adansonii* (Kiener)

Ethiopië (Yv. 849-853)

- 25 c - *Cucullaea leseburiana*
 50 c - *Ostrea (Gryphaea) plicatissima*
 90 c - *Trigonia cousorina*



Israel (Yv. 668-671)

- 2 p - *Lioconcha castrensis* (L.)
 2 p - *Chlamys sanguinolenta* Gmelin
 2 p - *Malea pomum* (L.)
 2 p - *Cypraea isabella* L.



Rep. Yemen (Yv. 184-187)

- 60 f - *Voluta duponti* Weaver
 90 f - *Afrivoluta pringlei* Tomlin
 110 f - *Conus splendidulus* Sowerby
 180 f - *Cypraea broderipi* Sowerby

Djibouti (Yv. 465)

- 45 f - *Glossodorus* sp.



1978

Polynesië (Yv. 132-134)

- 22 f - *Cypraea annulus* L.
 24 f - *Cypraea ventriculus* Lam.
 31 f - *Lambis robusta* (Swainson)



Nieuw-Zeeland (Yv. 724)

- 35 c - *Architeuthis longimanus*
 (De op deze zegel eveneens afgebeelde vissen zijn *Scomber hispaniolica*, *Chrysophrys major* en *Promicrops lanceolatus*)

Seychellen (Yv. 384-385)

- 5 rs - *Octopus* sp.
 10 rs - *Cypraea tigris* L.



Djibouti (Yv. 486-487)

- 10 f - *Charonia lampas lampas* (L.)
80 f - *Charonia tritonis variegata* (Lam.)



Nieuw-Zeeland (Yv. 730-733; 755, 756)

- 20 c - *Haliotis iris* Martyn
30 c - *Mesodesma ventricosum* (Gray)
40 c - *Dosinia anus* Philippi
50 c - *Poireria zelandica* (Quoy & Gaimard)
1 \$ - *Pecten novaezealandiae* Reeve
2 \$ - *Astrea heliotropium* (Martyn)



1978-1979

Samoa (Yv. 413-421; 450, 451)

- 1 s - *Cypraea caurica* L.
2 s - *Cypraea isabella* L.
3 s - *Cypraea moneta* L.
4 s - *Cypraea erosa* L.
7 s - *Cypraea helvola* L.



- 10 s - *Cypraea asellus* L.
11 s - *Cypraea talpa* L.
12 s - *Cypraea childreni* Gray
13 s - *Conus vexillum* Gmelin
14 s - *Conus miles* L.
24 s - *Conus textile* L.
26 s - *Conus litteratus* L.
50 s - *Conus tessulatus* Born
1 \$ - *Conus marmoreus* L. forma *nigrescens* Sowerby
2 \$ - *Terebra maculata* (L.)
3 \$ - *Lambis scorpius* (*scorpius*) (L.)



1979

Papoea en Nieuw-Guinea (Yv. 350-353)

- 10 c - *Robostra arika* Burn
15 c - *Doris fidelis* (Kelaart)
35 c - *Flabellina macassarana* Bergh
40 c - *Glossodoris trimarginata* Winckworth



Man (Yv. 131)

- 6 p - *Hinia kermodei* (Kendall)



Malediveneilanden (Yv. 751-757; BF 53)

- 1 1 - *Cypraea guttata* Gmelin
 - 2 1 - *Conus imperialis* L.
 - 3 1 - *Turbo marmoratus* L.
 - 10 1 - *Lambis truncata* (Lightfoot)
 - 1 r - *Cypraea leucodon* Broderip
 - 1.80 r - *Conus figulinus* L.
 - 3 r - *Conus gloriamaris* Chemnitz
 - 5 r - *Vasum turbinellum* L.
- (De 5 r is in blok uitgegeven).



Turks & Caicos-eilanden (Yv. 416)

- 25 c - *Strombus gigas* L.



Polynesië (Yv. 142-144)

- 20 f - *Hastula strigilata* (L.)
- 28 f - *Scabricola variegata* (Gmelin)
- 35 f - *Fusinus undatus* (Gmelin)



Grenada (Yv. 878-880)

- 60 c - *Oliva reticularis greenwayi* Clench
- 70 c - *Chicoreus brevifrons* (Lam.)
- 75 c - *Tonna galea* L.



Grenada - Grenadines (Yv. 307, 308, 310)

- 60 c - *Turbo filosus* Wood
- 70 c - *Strombus costatus* Gmelin
- 90 c - *Naticarius canrena* (L.)



Op bladzijde 20 is de op deze zegel afgebeelde slak niet van een naam voorzien. Thans kan met voldoende zekerheid worden aangenomen, dat we hier te doen hebben met *Cypshoma gibbosa* (L.).



Allereerst enige aanvullingen.

Op bladzijde 20 is een serie van Singapore opgenomen. Deze serie kent ook nog een 5\$ zegel met een afbeelding van *Sepia pharaonis* Ehrenberg. Deze zegel is gecatalogiseerd onder nummer Yv. 273.

Op bladzijde 22 staat een Nieuwzeelandse zegel met de afbeelding van *Architeuthis longimanus* vermeld. De auteur van deze soort is Kirk, 1888.

En dan nu weer een aantal nieuwe uitgiften, waarvan de eerste weliswaar als uitgekomen in 1978 staat geregistreerd, maar eerst in 1979 verkrijgbaar was.

Noord-Korea (Yv. 1467 - 1470, A 4)

- 2 ch - *Mactra chinensis* Philippi
- 5 ch - *Natica fortunel* Reeve
- 10 ch - *Arca inflata* Reeve
- 25 ch - *Rapana venosa* Valenciennes

Op de 50 ch ziet men behalve de vis *Sphoeroides porphyreus* op de zeebodem ook nog een exemplaar van *Rapana venosa* liggen.



Malta (Yv. 588, 591)

- 2 c - *Gibbula nivosa* A. Adams
- 25 c - *Pinna nobilis* L.



Wallis en Futuna (Yv. 249, 250, 253)
23 f - *Hexabranchus sanguineus* Rüppell & Leuckart
25 f - *Spondylus barbatus* Reeve
63 f - *Tridacna squamosa* Lam.



1979-1980

Maagdeneilanden (Yv. 372, 375, 376, 378)

- 8 c - *Charonia tritonis variegata* (Lam.)
- 13 c - *Cyphoma gibbosum* (L.)
- 20 c - *Fasciolaria tulipa* (L.)
- 25 c - *Strombus gallus* L.
- 30 c - *Strombus pugilis* L.
- 3 \$ - *Chicoreus brevifrons* (Lam.)



Djibouti (Yv. 512-514)

- 10 f - *Cypraea rufa* L.
 40 f - *Lambis chiragra arthritica* Röding
 300 f - *Harpa major* Röding



1980

Tuvalu (Yv. 126 - 129)

- 8 c - *Cypraea argus* L.
 20 c - *Cypraea scurra* Gmelin
 30 c - *Cypraea carneola* L.
 40 c - *Cypraea aurantium* Gmelin



Redonda (niet gecat.)

- 5\$ - *Cyphoma gibbosum* (L.)



Belize (Yv. 455 - 471; BF 10,11)

- 1 c - *Cypraea zebra* L.
 2 c - *Macrocallista maculata* (L.)
 3 c - *Arca zebra* (Swainson)

- 4 c - *Chama macerophylla* (Gmelin)

- 5 c - *Latirus cariniferus* Lam.
 10 c - *Conus spurius* Gmelin
 15 c - *Murex cabritii* Bernardi
 20 c - *Atrina rigida* (Lightfoot)
 25 c - *Chlamys imbricata* (Gmelin)
 35 c - *Conus granulatus* L.
 45 c - *Tellina radiata* L.
 50 c - *Leucozonia nassa leucoxonalis* (Lam.)
 85 c - *Pterotyphis triangularis* (A. Adams)
 1 \$ - *Strombus gigas* L.
 2 \$ - *Strombus gallus* L.
 5 \$ - *Fasciolaria tulipa* (L.)
 10 \$ - *Arene cruentata* (Mühlfeld)



De 85 c en de 5 \$ zijn evenals de 2 \$ en de 10 \$ samen in blokken verschenen. De afbeeldingen zijn gelijk aan die op de afzonderlijk verschenen zegels; alleen de randen van de zegels hebben andere kleuren.

Turks en Caicos-eilanden (Yv. 488-493)

- 15 c - *Charonia tritonis variegata* (Lam.)
 20 c - *Cypraea zebra* L.
 30 c - *Fasciolaria tulipa* (L.)
 45 c - *Lyropecten nodosus* (L.)
 55 c - *Tellina radiata* L.
 70 c - *Conus regius* Gmelin



Cayman-eiland (Yv. 451-454)

- 5 c - *Spondylus americanus* Hermann
 10 c - *Chicoreus brevifrons* (Lam.)
 30 c - *Cymatium femorale* L.
 50 c - *Vasum muricatum* (Born)



Kenia (Yv. 170)

- 3 sh - *Chromodoris quadricolor* (Rüppell)



Samoa (Yv. 470)

- 5 \$ - *Harpa major* Röding



El Salvador (Yv. 872-874; A446-449)

- 10 c - *Anadara grandis* (Broderip & Sowerby)
 15 c - *Hexaplex regius* (Swainson)
 25 c - *Polinices helicoides* (Gray)
 30 c - *Ostrea iridescens* Hanley



40 c - *Turritella leucostoma* Valenciennes

- 75 c - *Jenneria pustulata* (Lightfoot)
 1 C - *Pitar lulanaria* (Lesson)

Djibouti (Yv. 521, 522)

- 15 f - *Cypraea cribraria* (L.)
 85 f - *Nautilus pompilius* (L.)



Mauritius (Yv. 517)

- 2.50 r - *Conus milneedwardsi* Jousseaume

Filippijnen (Yv. 1209-1212)

- 40 s - *Siratus alabaster* (Reeve)
 60 s - *Tutufa bubo* (L.)
 1.20 p - *Homalocantha zambezi* (Burch & Burch)
 2 p - *Xenophora pallidula* (Reeve)



Mozambique (Yv. 773-778)

- 1 mt - *Harpa major* Röding
 1.50 mt - *Lambis chiragra arthritica* Röding



- 2.50 mt - *Murex pecten* Lightfoot
5 mt - *Architeconica perspectiva* (L.)
7.50 mt - *Chicoreus ramosus* (L.)
12.50 mt - *Strombus aurisdianae* (L.)

Cayman-eilanden (Yv. 460)
5 c - *Isognomon alatus* (Gmelin)



1981

Griekenland (Yv. 1434)
4 d - *Chlamys varia* (L.)



St. Helena (Yv. 343-346)
7 p - *Charonia tritonis variegata* (Lam.)
10 p - *Cypraea spurca sanctaehelenae* Schilder
25 p - *Janthina janthina* (L.)
53 p - *Pinna rudis* L.



Nieuw-Caledonië (Yv. 446-448)
1 f - *Cymbiola rossiniana* (Bernardi)
2 f - *Conus floccatus* Sowerby
13 f - *Cypraea stolidia* L.

Wallis en Futuna (Yv. 271)
40 f - *Conus textile* L.



Frans Polynesië (Yv. 164)
41 f - *Perna viridis* L.



IJsland (Yv. 529-530)
20 k - *Buccinum undatum* L.
600 k - *Chlamys islandica* (Müller)





De afbeelding van deze Conus is eerst later beschikbaar gekomen. De zegel is reeds vermeld op bladzijde 27.

Op bladzijde 26 is een lange serie van Belize aangekondigd, uitgegeven in 1980. In 1981 zijn van die serie de waarden 10c, 50c, 85c en 1\$ opnieuw verschenen. Weliswaar verschillen deze zegels op het oog niet van die welke het jaar daarvoor zijn verschenen, maar bij nauwkeuriger bestudering ontdekt men, dat links onder 1981 staat vermeld, terwijl de oorspronkelijke serie het jaartal 1980 draagt.



China (Yv. 2492)

4 c - *Cypraea moneta* L.



St. Tome & Principe (Yv. 626-631; BF 22)

0.50 db - *Bolinus cornutus* (L., 1758)

0.50 db - *Hexaplex duplex* (Röding, 1798)

1 db - *Cassis tesselata* (Gmelin, 1791)

1.50 db - *Harpa doris* Röding, 1798

10 db - als 0.50 db (1)

11 db - *Strombus latus* Gmelin, 1791

15 db - *Conus genuanus* L., 1758

17 db - *Cymbium glans* (Gmelin, 1791)

De 10 db en 15 db zijn samen in een blok uitgegeven. Alle afbeeldingen suggereren ten onrechte, dat er sprake is van linksgewonden schelpen.

1982



Bermuda (Yv. 409 - 412)

10 c - *Conus* sp.

25 c - *Bursa finlayi* McGinty, 1962

30 c - *Sconsia striata* (Lam., 1816)

1 \$ - *Pterynotus lightbourni* Harasewych & Jensen, 1979



Oman (Yv. 216 - 219)

30 c - *Ranularia boschi* Abbott & Lewis, 1970

40 b - *Acteon eloisae* Abbott, 1973

50 b - *Cypraea teulerei* Cazanaville, 1845

75 b - *Cypraea pulchra* Gray, 1824

Wallis en Futuna (Yv. 291 - 296)

10 f - *Cypraea talpa* L., 1758

15 f - *Cypraea vitellus* L., 1758

25 f - *Cypraea argus* L., 1758

27 f - *Cypraea carneola* L., 1758



40 f - *Cypraea mappa* L., 1758
50 f - *Cypraea tigris* L., 1758

Ierland (Yv. 476)
22 p - *Ostrea edulis* L., 1758



Djibouti (Yv. 557 - 562)
10 f - *Cypraea erythraeensis* Sowerby, 1837
15 f - *Conus vexillum* Gmelin, 1791
25 f - *Cypraea pulchra* Gray, 1824
30 f - *Conus inscriptus* Reeve, 1843
70 f - *Casmaria ponderosa* Gmelin, 1791
150 f - *Cypraea exusta* Sowerby, 1832



Gabon (Yv. 507 - 509)
75 f - *Hexaplex duplex* (Röding, 1758)
100 f - *Chama crenulata* Lam., 1819
125 f - *Ringicardium ringens* (Bruguière, 1789)



Wallis & Futuna (Yv. 249, 250, 299, 300)
23 f - *Hexabranchus sanguineus* Rüppell & Leuckart
25 f - *Spondylus barbatus* Reeve, 1856
46 f - als 23 f
63 f - als 25 f



Cayman-eilanden (Yv. 509 - 512)
5 c - *Natica canrena* (L., 1758)
10 c - *Cassis tuberosa* (L., 1758)
20 c - *Strombus gallus* (L., 1758)
1 \$ - *Cypraeocassis testiculus* (L., 1758)

Salomonseilanden (Yv. 481 - 484)
12 c - *Oliva vidua* (Röding, 1798)
Conus generalis L., 1767
Murex tribulus L., 1758
35 c - *Chama iostoma* Conrad, 1837
Atrina vexillum (Born, 1778)
Anadara uropygmelana (Bory St. Vincent, 1824)
45 c - *Turris babylonia* (L., 1758)
Vexillum sp.
Vexillum sanguisugum (L., 1758)
50 c - *Trochus niloticus* L., 1758



Tunesië (Yv. 967,969,970)

- 200 f - *Mediterraneotrigonia cherahaliensis*
200 f - *Micreschara tunesiensis*
500 f - *Mantelliceras pervinquieri*



Caicos-eilanden (Yv. 11, 15)

- 8 c - *Strombus gigas* L., 1758
50 c - idem



Wallis en Futuna (Yv. 306-311)

- 10 f - *Conus tulipa* L., 1758
17 f - *Conus capitaneus* L., 1758
21 f - *Conus virgo* L., 1758

- 39 f - *Conus vitulinus* Hwass, 1792
52 f - *Conus marmoreus* L., 1758
65 f - *Conus leopardus* (Röding, 1798)



Trinidad & Tobago (Yv. 481)
70 c - *Strombus gigas* L., 1758



- Ascension (Yv. 348-352)**
7 p - *Tellina antonii* Philippi, 1844
12 p - *Nodipecten nodosus* (L., 1758)
15 p - *Cypraea lurida* L., 1758
20 p - *Nerita ascensionis* Gmelin, 1791
50 p - *Micromelo undatus* (Bruguière, 1792)



- Djiboeti (Yv. 569-573)**
15 f - *Marginella obtusa* Sowerby, 1846
30 f - *Conus jickelii* Weinkauff, 1873
55 f - *Cypraea macandrewi* Sowerby, 1870
80 f - *Conus cuvieri* Crosse, 1858
100 f - *Turbo petholatus* L., 1758

1983 - 1984



Palau (Yv. 10,14,42,44)

- 3 c - *Cypraea mappa* L., 1758
13 c - *Tridacna gigas* (L., 1758)
28 c - *Nautilus pompilius* L., 1758
1 \$ - *Loligo vulgaris* Lam., 1796

1984



Cayman-eilanden (Yv. 525-528)

- 3 c - *Natica floridana* (Rehder, 1943)
10 c - *Conus austini* Rehder & Abbott, 1951
30 c - *Colubraria obscura* (Reeve, 1844)
50 c - *Turbo cailletii* Fischer & Bernardi, 1856



Nieuw-Caledonië (Yv. 481-483)

- 5 f - *Conus planorbis* Born, 1778 forma *chenoui* Crosse, 1858
15 f - *Conus moluccensis* Küster, 1838

20 f - *Conus sp.*

De 20 f - zegel vermeldt *Conus optimus*. *Conus optimus* Sowerby, 1913 wordt in de literatuur in het algemeen beschouwd als een synoniem voor *Conus boeticus* Reeve, 1844, maar de afbeelding doet ernstig twijfelen, of we met die soort te maken hebben. Dit vereist nog nader onderzoek.

Suriname (Yv. 940-943)

- 40 c - *Arca zebra* (Swainson, 1833)
65 c - *Trachycardium egmontianum* (Shuttleworth, 1856)
70 c - *Tellina radiata* (L., 1758)
80 c - *Vermicularia knorrii* (Deshayes, 1843)



Brits Antarctisch Territorium (Yv. 139)

- 20 p - *Todarodes sagittatus* (Lam., 1798)

Palau (Yv. 32-41)

- 20 c - *Charonia tritonis tritonis* (L., 1758)
20 c - idem
20 c - *Cassis cornuta* L., 1758
20 c - idem
20 c - *Tridacna gigas* (L., 1758)
20 c - idem
20 c - *Strombus sinuatus* Humphrey, 1786
20 c - idem
20 c - *Chlamys pallium* L., 1758
20 c - idem

In deze serie is elke schelp zowel dorsaal als ventraal afgebeeld.



Marine Life of THE GAMBIA



Gambia (Yv. BF 12)

5 d (blok) – *Ovula ovum* (L., 1758)

Tonga (Yv. 559-565)

- 1 s – *Scabriola casta* (Gmelin, 1791)
- 5 s – *Cypraea mappa* L., 1758
 - f. *viridis* Kenyon, 1902
- 10 s – *Conus bullatus* L., 1758
- 15 s – *Conus textile* L., 1758
- 29 s – *Conus aulicus* L., 1758
- 47 s – *Lambis truncata sebae* (Kiener, 1843)
- 3 \$ – *Chicoreus palmarosae* (Lam., 1822)



Australië (Yv. 866, 869)

- 25 c – *Crenavolva renovata* Iredale, 1930
- 55 c – *Hypselodoris bennetti*



Cayman-eilanden (Yv. 534)

5 c – *Isognomon alatus* (Gmelin, 1791)

Deze zegel is een herdruk van de zegel genoemd op bladzijde 28 met als enige verschil, dat onderaan de zegel het jaartal 1984 staat vermeld.

St. Kitts (Yv. 559, 562)

10 c – *Lima scabra* Born, 1778

25 c – *Cyphoma gibbosum* (L., 1758)



Wallis en Futuna (Yv. 312-317)

- 22 f – *Strombus lentiginosus* L., 1758
- 25 f – *Lambis chiragra chiragra* (L., 1758)
- 35 f – *Strombus dentatus* L., 1758
- 43 f – *Lambis scorpius scorpius* (L., 1758)
- 49 f – *Strombus aurisdianae* L., 1758
- 76 f – *Lambis crocota crocota* (Link, 1807)



Luxemburg (Yv. 1057-1059)

4 f – *Pecten* sp. (fossiel)

7 f – *Gryphaea arcuata* Lam.

10 f – *Nodicoeloceras raquinianum* (d'Orbigny, 1844)

Montserrat (Yv. 554-557)

90 c – *Cittarium pica* (L., 1758)

1.15 \$ – *Lima scabra* Born, 1778

1.50 \$ – *Fasciolaria tulipa* (L., 1758)

2.50 \$ – *Strombus pugilis* L., 1758



1955

Joegoslavië (Yv. 1972)
5 d – *Aturia aturi* Basterot



Somalië

- 2.80 sh – *Volutocorbis rosavittoriae*
 3.20 sh – *Phalium bituberculatum* (von Martens, 1901)
 5.50 sh – *Conus milneedwardsi* Jousseaume, 1984
 15 sh – *Cypraea broderipi* Sowerby, 1832
 De 15 sh is uitgegeven in een blok, waarop tevens zijn afgebeeld: *Cypraea argus* L., 1758, *Cypraea talpa* L., 1758 en een niet te determineren Stomboseoort.



St. Vincent/Grenadines (Yv. 375-377)
60 c – *Strombus gigas* L. 1758
3 \$ – *Cittarium pica* (L., 1758)



Wallis en Futuna (Yv. 323-328)

- 2 f – *Nautilus pompilius* L., 1758
 3 f – *Chicoreus brunneus* (Link, 1807)
 41 f – *Casmaria erinaceus* (L., 1758)
 47 f – *Conus vexillum* Gmelin, 1791
 56 f – *Harpa harpa* L., 1758
 71 f – *Chicoreus ramosus* (L., 1758)



Nieuw-Caledonië (Yv. 494, 495)

- 55 f – *Conus bullatus* L., 1758
 72 f – *Conus lamberti* Sowerby, 1877



Verenigde Staten (Yv. 1579-1583)

- 22 c – *Nucella lamellosa* (Gmelin, 1791)
 22 c – *Cypraeocassis testiculus* (L., 1758)
 22 c – *Neptunea lyrata decemcostata* (Say, 1826)
 22 c – *Argopecten gibbus* (L., 1758)
 22 c – *Busycon contrarium* (Conrad, 1840)

ALLEREERST ENIGE AANVULLINGEN.

Robert Morrell vermeldt in *Pallidula* (vol. 18(3):41-43) de namen van de in de loop der tijd op postzegels afgebeelde fossiele schelpen. Daarbij treffen we enkele namen aan, die inderdaad in deze rubriek niet zijn opgenomen. Dit willen we daarom alsnog doen. In de eerste plaats gaat het om twee Zwitserse zegels uit 1958 en 1960, gecatalogiseerd onder de nummers Yvert 608 en 663, waarvan destijds – blad-



zijde 4 – slechts is vermeld ammoniet en *Gryphaea* sp. De ammoniet wordt door Morrell vermeld als *Lytoceras fimbriatum* Sowerby en de *Gryphaea* als *Gryphaea arcuata* Lamarck. Beide soorten leefden in West-Europa in de Jura-periode. Op dezelfde bladzijde van deze rubriek was nog een ammoniet vermeld, voorkomende op een postzegel uit Cuba (Yv. A184). Dit is volgens Morrell *Perisphinctes spinatus*. Zijn mededeling,



dat *Trigonia cossobrina* afgebeeld op een zegel van Ethiopië (pag. 22) een Brachiopode zou zijn, is ons inziens niet juist. De familie der Trigoniidae behoort tot de tweekleppigen en niet tot de Brachiopoda.

En dan nu weer de nieuwe uitgiften.

Barbados (Yv. 617)

65 c – *Cyphoma gibbosum* (L., 1758)



Marshall-eilanden (Yv. 73 - 77)

- 22 c – *Cymatium lotorum* (L., 1758)
- 22 c – *Chicoreus cornucervi* (Röding, 1798)
- 22 c – *Strombus aurisdianae* L., 1758.
- 22 c – *Turbo marmoratus* L., 1758
- 22 c – *Chicoreus palmarosae* (Lam., 1822)



Palau (Yv. 69)

- 14 c – *Charonia tritonis tritonis* (L., 1758)


Libië (Yv. 1508 - 1523)

Deze serie zegels, uitgegeven in een vel, is wegens de slechte afbeeldingen moeilijk te determineren. Hier is ervan uitgegaan, dat het kennelijk de bedoeling is geweest om soorten uit de Middellandse Zee af te beelden. Zelfs de familienamen op de zegels vormen geen betrouwbare leidraad, zoals Mytilidae bij een soort die duidelijk tot de Cuspidariidea behoort. Dit alles betekent, dat onjuistheden niet zijn uitgesloten.

- 25 c – *Cuspidaria* cf. *cuspidata* (Olivi, 1792)

- 25 c – *Murex brandaris* L., 1758


- 25 c – *Cerastoderma* cf. *edule* (L., 1758)



120 f – *Perrona nifat* (Bruguière, 1789)

125 f – *Cypraea stercoraria* L., 1758

270 f – *Conus genuanus* L., 1758



Djibouti (Yv. 609 - 613)

10 f – *Cypraea nebrites* Melville, 1888

15 f – *Cypraea turdus* Lam., 1810

30 f – *Conus acuminatus* Hwass, 1792

40 f – *Cypraea camelopardalis* Perry, 1811

55 f – *Conus terebra* Born, 1778



25 c – *Coralliophila babelis* (Requien, 1848)

25 c – *Hexaplex trunculus* (L., 1758)

25 c – *Thais haemastoma* (L., 1758)

25 c – *Cythara attenuata* (Montagu, 1803)

25 c – *Argonauta argo* L., 1758

25 c – *Tonna galea* (L., 1758)

25 c – *Aporrhais serresianus* (Michaud, 1827)

25 c – *Clanculus cruciatus* (L., 1758)

25 c – *Cancellaria cf. cancellata* (L., 1767)

25 c – *Epitonium celestei* (Aradas, 1854)

25 c – *Turbo* sp.

25 c – *Mitra zonata* Marryatt, 1817

25 c – *Chlamys pecten* (L., 1758)

Togo (Yv. 1184; A564 - 567)

70 f – *Clavatula muricata* (Lam., 1822)

90 f – *Marginella desjardini* Marche-Marchad,
1957

Grenada-Grenadines (Yv. 608)

60 c – *Strombus gigas* L., 1758



IJsland (Yv. 589)

700 au – *Todarodes sagittatus* (Lam., 1798)



Joegoslavië (Yv. 2003)

70 D – *Pecten jacobaeus* (L., 1758)



1985-1986



Comoren (Yv. 421 - 425)

- 75 f – *Lambis chiragra arthritica* Röding, 1798
- 125 f – *Strombus lentiginosus* L., 1758
- 200 f – *Tonna galea* (L., 1758)
- 300 f – *Cymbium glans* (Gmelin, 1791)
- 450 f – *Lambis crocata crocata* (Link, 1807)



Vanuatu (Yv. 727 - 730)

- 20 f – *Chromodoris elisabethina* Bergh, 1877
- 35 f – *Dictyodoris aurantiomaculata* Allan, 1932
- 55 f – *Chromodoris kuniei* Pruvot-Fol, 1930
- 100 f – *Notodoris minor* Eliot, 1904

Cocos (Keeling) Eilanden (Yv. 134 - 141; 145 - 152)

- 1 c – *Trochus maculatus* L., 1758
- 2 c – *Smaragdia rangiana* (Récluz, 1841)
- 3 c – *Chama* sp.
- 4 c – *Cypraea moneta* L., 1758
- 5 c – *Drupa morum* Röding, 1798
- 10 c – *Conus miles* L., 1758
- 15 c – *Terebra maculata* L., 1758
- 20 c – *Fragum fragum* (L., 1758)
- 30 c – *Turbo lajonkairii* Deshayes, 1839
- 33 c – *Scabridcola fissurata* (Lam., 1811)
- 40 c – *Lambis lambis* L., 1758
- 50 c – *Tridacna squamosa* Lam., 1819
- 60 c – *Cypraea histrio* Gmelin, 1791
- 1 \$ – *Phyllidia varicosa* (Lam. 1801)
- 2 \$ – *Halgerda tessellata* (Bergh, 1880)
- 3 \$ – *Harminoea cymbalum* Quoy & Gaimard, 1833



1986

Wallis & Futuna (Yv. 337 - 342)

- 4 f – *Lambis truncata sebae* (Kiener, 1843)
- 5 f – *Charonia tritonis tritonis* (L., 1758)
- 10 f – *Oliva miniacea* (Röding, 1798)
- 18 f – *Distorsio anus* (L., 1758)

25 f – *Mitra mitra* (L., 1758)

107 f – *Conus distans* Hwass, in Bruguière, 1792



Falklandeilanden (Yv. 452 - 455)

7 p – *Fissurella picta* (Gmelin, 1791)

22 p – *Odontocymbiola magellonica* (Gmelin, 1791)

27 p – *Chlamys lischkei* (Dunker, 1850)

54 p – *Acanthina monodon* (Pallas, 1774)
f. *imbricata* Lam., 1816



Papoea & Nieuw-Guinea (Yv. 511 - 514)

15 t – *Cypraea valentia* Perry, 1811

35 t – *Oliva buloui* Sowerby, 1887

45 t – *Oliva parkinsoni* Prior, 1975

70 t – *Cypraea aurantium* Gmelin, 1791



Marshalleilanden (Yv. 111 - 114)

14 c – *Charonia tritonis tritonis* (L., 1758)

14 c – *Tridacna gigas* (L., 1758)

14 c – *Tridacna maxima* (Röding, 1798)



Palau (Yv. 92 - 131)

Een vel met 40 zegels, voorstellende het rifleven van dit eiland.
Daarbij zijn vier zegels met weekdieren:

14 c – *Octopus* sp.

14 c – *Sepia* sp.

14 c – *Strombus gigas* L., 1758

14 c – *Tridacna gigas* (L., 1758)

Australië (Yv. 950, 953)

45 c – *Conus textile* L., 1758

70 c – *Hapalochlaena maculosa* Hoyle, 1883



Cyprus (Yv. 653 - 656)


5 c – *Manupecten pesfelis* (L., 1758)

7 c – *Charonia tritonis variegata* (Lam., 1816)

18 c – *Murex brandaris* L., 1758

25 c – *Cypraea spurca* L., 1758





EERST NOG ENKELE AANVULLINGEN.

De 10 c – zegel van de op bladzijde 29 vermelde serie van Bermuda (Yv. 409) toont een conus,

waarvan de naam niet bekend was. Volgens de heer Smits in Fauna van De Beeldfilatelist (no. 84, 1987) hebben we hier te doen met de Caribi-

sche soort *Conus centurio* Born, 1786. Deze determinatie lijkt ons correct.

Op bladzijde 34 is een serie uit Somalië opgenomen, maar zonder vermelding van de catalogusnummers. Die zijn Yvert 305-307; BF 13.

Soms worden op blokken merkwaardige combinaties gemaakt. Op een blok, behorende bij een serie van Antigua & Barbuda met afbeeldingen van paddestoelen, ligt tussen de varens een exemplaar van *Strombus gigas* L., 1758. Dat blok is later ook nog eens verschenen met de opdruk Barbuda. Zegels met opdrukken – soms heeft het land weer eens een andere naam gekregen, soms zijn de waarden gewijzigd – worden in deze rubriek niet afzonderlijk opgenomen, indien de zegel al zonder die opdruk is vermeld.

En dan nu nog een aantal nieuwere uitgiften.

Grenada (Yv. 1331 - 1334; BF 152)

- 25 c – *Latirus infundibulum* (Gmelin, 1791)
60 c – *Epitonium lamellosum* (Lam., 1822)
70 c – *Arca zebra* (Swainson, 1833)
4 \$ – *Strombus gallus* L., 1758
5 \$ – *Cymatium femorale* (L., 1758)



Grenada-Grenadines (Yv. 670 - 673; BF 112)

- 15 c – *Pyramidella dolabrata* (L., 1758)
50 c – *Siratus beauforti* (Fischer & Bernardi, 1857)
1.10 \$ – *Strombus pugilis* L., 1758
4 \$ – *Conus spurius* Gmelin, 1791
5 \$ – *Hydatina vesicaria* (Lightfoot, 1786)

Tanzania (Yv. 296)

- 20 sh – *Octopus* sp.



Palau (Yv. 132 - 136)

- 22 c – *Tectus niloticus* (L., 1767)
22 c – *Conus marmoreus* L., 1758
22 c – *Tridacna squamosa* Lam., 1819
22 c – *Cypraeocassis rufa* (L., 1758)
22 c – *Cypraea aurantium* Gmelin, 1791



Marshall-eiland (Yv. 119 - 123)

- 22 c – *Chicoreus ramosus* (L., 1758)
22 c – *Lambis crocata crocata* (Link, 1807)
22 c – *Bursa lissostoma* (E.A. Smith, 1914)
22 c – *Strombus sinuatus* Humphrey, 1786
22 c – *Bursa bubo* (L., 1758)



Antigua & Barbuda (Yv. 919 - 922; BF 112)

- 15 c – *Cerithium muscarum* Say, 1832
45 c – *Phalium cicatricosum* Gmelin, 1791
60 c – *Melongena melongena* (L., 1758)
3 \$ – *Siratus ciboney* (Clench & Farfante, 1945)
5 \$ – *Natica canrena* L., 1758

Malediven (Yv. 1098)

- Rf 2 – *Cypraea tigris* L., 1758



Caimanen (Yv. 599, 602)

- 75 c – *Cyphoma gibbosum* (L., 1758)
4 \$ – *Lima scabra* Born, 1778



St. Kitts (Yv. 608)

- 10 c – *Lima scabra* Born, 1778

(Het gaat hier om dezelfde zegel als vermeld en afgebeeld op bladzijde 33, maar met het jaartal 1986)

1987

Jamaica (Yv. 661-664)

- 35 c – *Conus regius* Gmelin, 1791
75 c – *Cypraea zebra* L., 1758
1 \$ – *Charonia tritonis variegata* (Lam., 1816)
5 \$ – *Strombus gallus* L., 1758



Fiji (Yv. 558-563)

- 15 c – *Conus mustelinus* Hwass in Bruguière, 1792
20 c – *Conus pertusus* Hwass in Bruguière, 1792
25 c – *Conus ammiralis* L., 1758
40 c – *Conus scabriusculus* Deltwyn, 1817
50 c – *Conus imperialis* L., 1758
1 \$ – *Conus geographus* L., 1758

Nigeria (Yv. 505-508)

- 10 k – *Galatea paradoxa* (Born, 1778)
20 k – *Tympanotonus fuscatus* (L., 1758)
25 k – *Senilia senilis* (L., 1758)



30 k – *Crassostrea tulipa* (Lam.)

Op de 10 k zegel staat vermeld *Egeria radiata* en „fresh water clam”. De naam is een synoniem en deze soort is een brakwaterbewoner.

Dominica (Yv. 957-960; BF 119)

35 c – *Cymatium cingulatum* (Lam., 1822)

45 c – *Janthina globosa* Swainson, 1822

60 c – *Fasciolaria lilium hunteria* (Perry, 1811)

5 \$ – *Thais deltoidea* (Lam., 1822)

5 \$ – *Scaphella junonia* (Lam., 1804)

De laatste zegel is in blok verschenen.



Japan (Yv. 1629)

60 y – *Chromodoris festiva* (A. Adams, 1861)

Chromodoris aureopurpurea Collingwood, 1881



Seychellen (Yv. 623-626)

1 R – *Cryptocarpus pallium* (L., 1758)

2 R – *Spondylus versicolor* Schreibers, 1793

3 R – *Harpa ventricosa* Lam., 1816

Lioconcha ornata (Lam., 1817)

10 R – *Strombus lentiginosus* L., 1758



Nieuw-Caledonië (Yv. 538-539)

28 f – *Cypraea moneta* L., 1758

36 f – *Cypraea martini* Schepman, 1907



Wallis & Futuna (Yv. 360-365)

3 f – *Cymatium pileare* L., 1758

4 f – *Conus textile* L., 1758

28 f – *Cypraea mauritiana* L., 1758

44 f – *Bursa bubo* (L., 1758)

48 f – *Cypraea testudinaria* L., 1758

78 f – *Cypraeacassis rufa* L., 1758



Palau (Yv. 174-178)

22 c – *Cymatium hepaticum* (Röding, 1798)

22 c – *Turbo petholatus* L., 1758

22 c – *Chicoreus brunneus* (Link, 1807)

22 c – *Vexillum vulpecula* (L., 1758)

22 c – *Mitra cardinalis* (Gmelin, 1791)



Marshalleilanden (Yv. 156-160)

- 22 c – *Conus pennaceus* Born, 1778
22 c – *Tonna perdix* (L., 1758)
22 c – *Lambis scorpius scorpius* (L., 1758)
22 c – *Cymatium pileare* L., 1758
22 c – *Lambis chiragra chiragra* (L., 1758)



Barbuda (Yv. 899)

75 c – *Charonia tritonis variegata* (Lam., 1816)

Aruba (Yv. 25)

45 c – *Strombus gigas* L., 1758

Gabon (Yv. 621-622; BF 52)

90 f – *Natica fanel* (Röding, 1798)
125 f – *Natica fulminea* (Gmelin, 1791)
Ook samen in een blok.



REPUBLIQUE GABONAISE

St. Pierre & Miquelon (Yv. 484-485)

Blok van twee zegels van 3,00 f, verbonden door een tussenstuk waarop een mossel is afgebeeld.





Anguilla (Yv. 702, 704; BF 79)

10 c – *Cittarium pica* (L., 1758)

50 c – *Vasum capitellum* (L., 1758)

6 \$ – *Strombus gigas* L., 1758

De laatste in een blok, waarop tevens *Cypraeacassis testiculus* L., 1758 is afgebeeld.



Christmas-eiland (Yv. 261-262)

40 c – *Cypraeacassis rufa* L., 1758

50 c – *Conus textile* L., 1758

Palau (Yv. 201)

22 c – *Chromodoris quadricolor* Barnard, 1927

Afgebeeld met de poetsgarnaal *Stenopus hispidus*



Zuid-Georgië & Zuid-Sandwicheilanden (Yv. 184 – 187)

10 p – *Gaimardia trapezina* (Lam., 1819)

24 p – *Margarites (Margarella) tropidophoroides* (Strebel, 1908)

29 p – *Trophon scotianus* Powell, 1951

58 p – *Chlanidota densesculpta* (Martens, 1885)



1988

Nevis (Yv. 486 – 490)

15 c – *Strombus gallus* Gmelin, 1791

40 c – *Strombus gallus* L., 1758

60 c – *Cassis madagascariensis* Lam., 1822

2 \$ – *Strombus gigas* L., 1758

3 \$ – *Cassis tuberosa* (L., 1758)


Tuvalu (Yv. 484A)

15 c – *Hexabranchus sanguineus* Rüppell & Leuckart, 1832

RECTIFICATIE. Op bladzijde 44 is bij Nevis tweemaal de naam *Strombus gallus* vermeld. Bij de 15 c moet dit zijn *Strombus raninus* Gmelin, 1791.



St. Vincent/Grenadines (Yv. 529)
50 c - *Cyphoma gibbosum* (L., 1758)



Japan (Yv. 1676, 1677)
40 y - *Babylonia japonica* (Reeve, 1842)
60 y - *Guildfordia triumphans* (Philippi, 1841)



Palau (Yv. 211 - 215)
25 c - *Engina mendicaria* (L., 1758)

25 c - *Conus eburneus* Hwass, 1792
25 c - *Vexillum plicarium* (L., 1758)
25 c - *Mitra mitra* (L., 1758)
25 c - *Cypraea isabella* L., 1758



Joegoslavië (Yv. 2154 - 2157)
106 d - *Gibbula magus* L., 1758
550 d - *Pecten jacobaeus* (L., 1758)
600 d - *Tonna galea* (L., 1758)
1000 d - *Argonauta argo* L., 1758



Nicaragua (Yv. 1509; A 1240 - 1245)
4 c - *Strombus pugilis* L., 1758
(12 c - een landslak *Polymita picta* Born)
16 c - *Architectonica maxima* (Philippi, 1849)
20 c - (?) *Pecten albicans* Schröter, 1802
24 c - *Guildfordia triumphans* (Philippi, 1841)
28 c - (?) *Argobuccinum pustulosum* (Lightfoot, 1786)
50 c - *Trochus maculatus* L., 1758

Montserrat (Yv. 676 - 691)
5 c - *Pleuroloca aurantiaca* Lam., 1816

- 10 c - *Chlamys imbricata* (Gmelin, 1791)
 15 c - *Conus delessertii* Récluz, 1843
 20 c - *Coralliophila aberrans* (C.B. Adams, 1850)
 25 c - *Architectonica nobilis* Röding, 1798
 40 c - *Cassis tuberosa* (L., 1758)
 55 c - *Turbo canaliculatus* Hermann, 1781
 70 c - *Fasciolaria tulipa* (L., 1758)
 90 c - *Voluta musica* L., 1758

- 1 \$ - *Terebra taurina* (Lightfoot, 1786)
 1.15 \$ - *Strombus gallus* L., 1758
 1.50 \$ - *Strombus gigas* L., 1758
 3 \$ - *Perotrochus teremachii* Kuroda, 1955
 5 \$ - *Melongena corona* (Gmelin, 1791)
 7.50 \$ - *Siratus beauvii* (Fischer & Bernardi, 1857)
 10 \$ - *Charonia tritonis variegata* (Lam., 1816)



Palau (Yf. BF)

Een blok met vijf zegels, gewijd aan de daar voorkomende *Nautilus belauensis* Saunders, 1981. Maar ook *N. pompilius* L., 1758, *N. macromphalus* Sowerby, 1849, *N. stenomphalus* Sowerby, 1849 en *N. scrobiculatus* (Lightfoot, 1786) zijn afgebeeld op een der zegels.

